



Norg en Norg-Schulpen,
Huisartsen
Kerkplein 7
6081BA ■ Haalen
0475-595000
norghaalen.uwartzonline.nl

Vorbereiding voor een spirometrie (longfunctieonderzoek)

Ter voorbereiding op de spirometrie is het van belang dat u:

- * tijdig met uw medicatie stopt;
- * vlak voor het onderzoek geen zware inspanningen verricht, zodat u rustig en ontspannen bent;
- * geen zware maaltijd eet;
- * geen knellende kledingstukken draagt, zoals bijvoorbeeld een korset.

Tijdelijk stoppen van medicijnen

Medicijnen zijn vaak onder verschillende namen te verkrijgen. Het kan dus zijn dat een medicijn dat u gebruikt niet in onderstaand overzicht staat. Bij twijfel of u het medicijn tijdelijk moet stoppen, of als dit niet lukt (bijv. als u kortademig bent), neem dan even contact met ons op.

48 uur voor het onderzoek stoppen:

- * Eklira (aclidiniumbromide) * Hirobriz (indacaterol) * Onbrez (indacaterol) * Seebri (glycopyrronium) * Singulair (montelukast)
- * Spiriva (tiotropiumbromide) * Spiriva respimat

12 uur voor het onderzoek stoppen

- * Atimos (formoterolfumaraat dihydraat) * Flutiform (formoterol en fluticason) * Foradil (formoterol)
- * Foster (beclometason en formoterol) * Oxis (formoterol) * Seretide (salmeterol en fluticason) * Serevent (salmeterol)
- * Symbicort (formoterol en budesonide)

4 uur voor het onderzoek stoppen

- * Aerolin (salbutamol) * Aeromir (salbutamol) * Atrovent (ipratropiumbromide) * Berodual (ipratropiumbromide en fenoterol)
- * Berotec (fenoterol) * Bricanyl (terbutaline) * Combivent (salbutamol en ipratropiumbromide) * Salbutamol (salbutamol)
- * Ventolin (salbutamol)

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Na het onderzoek kunt u uw eigen medicijnen weer volgens voorschrift gebruiken.

HET IS BELANGRIJK DAT U UW MEDICIJNEN MEEBRENGT NAAR DE AFSPRAAK !